

# 继发性/转移性（导管型）乳腺癌

也称为转移性或晚期乳腺癌

在原发性乳腺癌之后, 请注意这些继发性乳腺癌的**警惕症状\***。  
可出现继发性乳腺癌的 5 个主要区域。



## 脑

经常头痛、呕吐（早上第一件事）、头晕、视力障碍、癫痫发作、智力功能受损、运动技能受损、情绪波动、失去平衡、疲劳。家人和朋友觉得你表现异常。



## 骨头


骨骼疼痛——通常为大腿、手臂、肋骨和背部。可能是钝痛或剧烈的刺痛。没有明显原因或外伤时发生的骨痛。

及时报告任何新的、异常的或加剧的疼痛。



## 肺

胸部和背部呼吸时剧烈疼痛、无痰咳嗽、疲劳、血栓也会导致呼吸急促。



## 淋巴结

胸部/腋窝/颈部的肿胀或肿块和压力, 干咳。



## 肝脏


腹胀、食欲不振、体重减轻、疲劳、虚弱、右侧肋骨附近疼痛。



## 脊髓压迫

罕见但在乳腺癌中更常见，需要紧急治疗

背部或颈部的中部或顶部的疼痛或压痛，腰部剧烈疼痛且恶化或不消失，咳嗽、打喷嚏或用力时更严重的背部疼痛，夜间更严重的背痛，麻木，沉重感，胸部或腹部周围的疼痛带或沿手臂或腿部往下的疼痛，感觉的变化，例如针刺感或电击感。如果您有以下症状，请尽快联系临床医疗团队——使用手臂或腿部时感觉无力或困难，背部通道周围区域（鞍区）麻木，无法排空肠道或膀胱，难以控制肠道或膀胱。



敬请访问：[abcdiagnosis.co.uk](http://abcdiagnosis.co.uk)

Twitter: @abcdiagnosis

Facebook: [facebook.com/abcdiagnosis](https://facebook.com/abcdiagnosis)

\*如果警惕症状持续超过 3 周，请直接联系您的医疗团队

**abcd**  
After Breast Cancer Diagnosis