

Sekundärer / Metastasierter (duktaler) Brustkrebs

Auch als metastasierter oder fortgeschrittener Brustkrebs bekannt

Achten Sie nach dem primären Brustkrebs auf diese **Warnsignale*** von sekundärem Brustkrebs. Es gibt 5 Hauptbereiche, in denen sekundärer Brustkrebs auftreten kann.



GEHIRN

Häufig auftretende Kopfschmerzen, Erbrechen (früh am Morgen), Schwindelgefühl, Sehstörungen, Anfälle, Beeinträchtigung der geistigen Fähigkeiten, Beeinträchtigung der motorischen Fähigkeiten, Stimmungsschwankungen, Gleichgewichtsstörungen, Erschöpfung. Familienmitglieder und Freunde meinen, dass Sie nicht so wie sonst sind.




KNOCHEN

Schmerzen in den Knochen: normalerweise Oberschenkel, Arm, Rippen und Rücken. Dabei kann es sich um einen dumpfen oder stechenden Schmerz handeln. Schmerzende Knochen ohne offensichtliche Ursache oder Trauma. Melden Sie alle neuen, ungewöhnlichen oder stärker werdenden Schmerzen.



LUNGE

Stechende Schmerzen beim Einatmen im Brust- und Rückenbereich, nichtproduktiver Husten, Blutklümpchen können auch Atemnot verursachen.



LYMPHKNOTEN

Schwellungen oder Knoten und Druckgefühl im Brust-, Achsel-, Nackenbereich, trockener Husten.



LEBER


Völlegefühl, Beeinträchtigung des Appetits, Gewichtsverlust, Abgeschlagenheit, Schmerzen auf der rechten Seite in Rippennähe.



RÜCKENMARKSKOMPRESSION

Eine seltene, doch bei Brustkrebs häufiger auftretende Form, die **SCHNELLSTENS** behandelt werden muss

Schmerzen oder Empfindlichkeitsgefühl im mittleren und oberen Rücken oder Nacken, starke Schmerzen im unteren Rücken, die schlimmer werden oder anhalten, Schmerzen im Rücken, die beim Husten, Niesen oder bei Anstrengung schlimmer werden, Rückenschmerzen, die bei Nacht schlimmer werden, Taubheitsgefühl, Schweregefühl, Schmerzen, die den Brustraum oder Unterleib umgeben oder Schmerzen, die einen Arm oder ein Bein hinunter verlaufen, Veränderungen bei Sinneseindrücken, z. B. ein Kribbeln oder das Gefühl eines Elektroschocks. **Kontaktieren Sie Ihr medizinisches Team SOFORT, wenn bei Ihnen die folgenden Symptome auftreten:** Schwächegefühl oder Schwierigkeiten, Arme und Beine zu bewegen, Taubheitsgefühl im Bereich des Afters (des Sattelbereichs), wenn Sie den Darm oder die Blase nicht entleeren können, Probleme haben, den Darm oder die Blase zu kontrollieren.



Bitte besuchen Sie: abcdiagnosis.co.uk

Twitter: @abcdiagnosis

Facebook: [facebook.com/abcdiagnosis](https://www.facebook.com/abcdiagnosis)

***SOLLTEN DIESE ALS WARNSIGNALE ANZUSEHENDEN PROBLEME LÄNGER ALS DREI WOCHEN ANHALTEN, KONTAKTIEREN SIE BITTE DIREKT IHR MEDIZINISCHES TEAM.**

abcd
After Breast Cancer Diagnosis