

Carcinoma mammario (duttale) metastatico / secondario

Anche conosciuto come carcinoma mammario metastatico o avanzato.

Dopo il carcinoma mammario primario presta attenzione all'insorgere di questi **campanelli d'ALLARME*** che potrebbero indicare la presenza di un carcinoma mammario secondario. Il carcinoma mammario secondario può comparire in 5 principali aree.



CERVELLO

Cefalee frequenti, vomito (in particolare al mattino), vertigini, disturbi visivi, crisi epilettiche, funzionamento intellettuale compromesso, abilità motorie compromesse, cambi d'umore, perdita di equilibrio, stanchezza. Familiari e amici possono farti notare che sembri un'altra persona.




OSSA

Dolori alle ossa, di solito in corrispondenza di cosce, braccia, costole e schiena. Il dolore può essere sordo o con fitte lancinanti. Il dolore alle ossa non sembra associato a una causa evidente o a un trauma. Comunica ogni dolore nuovo, insolito o crescente.



POLMONI

Dolore lancinante durante la respirazione in corrispondenza del petto e della schiena, tosse non produttiva, stanchezza, emboli che possono anche provocare dispnea.



LINFONODI

Gonfiore o noduli e pressione nella zona di petto/ascella/collo, tosse secca.



FEGATO


Gonfiore, cambi nell'appetito, perdita di peso, stanchezza, debolezza, dolore in corrispondenza delle costole nel lato destro.



COMPRESSIONE DEL MIDOLLO SPINALE

Raro ma più comune nel carcinoma mammario, necessita un trattamento **URGENTE**

Dolore o indolenzimento nella parte media o superiore della schiena o del collo, dolore intenso nella parte inferiore della schiena che peggiora e persiste, mal di schiena che peggiora tossendo, starnutando o sotto sforzo, mal di schiena che peggiora di notte, intorpidimento, pesantezza, una fascia di dolore intorno al petto o all'addome, o dolore lungo un braccio o una gamba, sensazioni mutevoli come, per esempio, formicolii o scosse elettriche. **Contatta AL PIÙ PRESTO la tua équipe medica se si presentano i seguenti sintomi:** debolezza o difficoltà a usare braccia o gambe, intorpidimento in corrispondenza della zona rettale, impossibilità di defecare od urinare, problemi d'incontinenza.



Visita: abcdiagnosis.co.uk

Twitter: @abcdiagnosis

Facebook: facebook.com/abcdiagnosis

***SE I CAMPANELLI D'ALLARME DURANO PIÙ DI 3 SETTIMANE,
CONTATTA LA TUA ÉQUIPE MEDICA**

abcd
After Breast Cancer Diagnosis