


# سرطان الثدي الثانوي/النقيلي (الفصيبي)

يُعرف أيضًا باسم سرطان الثدي النقيلي أو المتقدم

بعد الإصابة بسرطان الثدي الأولي، انتبهي لهذه **العلامات التحذيرية\*** لسرطان الثدي الثانوي. هناك 3 مناطق رئيسية قد يحدث فيها سرطان الثدي الثانوي.

قد تكون الأعراض محاكية لأنواع السرطان الأخرى؛\* لذا تذكري، إذا استمرت مشكلة العلامة التحذيرية لأكثر من 3 أسابيع، فاتصلي بفريقك الطبي مباشرة



## أعراض أخرى

### الكبد:

انتفاخ، ضعف الشهية، فقدان الوزن، إرهاق، ضعف، ألم بالقرب من الضلوع على الجانب الأيمن.

### الرئة:

ألم حاد عند التنفس في منطقة الصدر والظهر، سعال بدون بلغم، تعب، جلطات دموية قد تسبب كذلك ضيق التنفس.

### الدماغ:


صداع متكرر، ضعف المهارات الحركية، قيء (أول شيء في الصباح)، دوار، اضطراب الرؤية، اختلاجات، قصور وظيفي ذهني، تقلبات مزاجية، اختلال التوازن، تعب. قد يُخبرك أفراد العائلة والأصدقاء أنك لست في حالتك الطبيعية.

### العين (نادر جدًا):

تغيرات الرؤية - خاصة في جانب واحد، تورم، ألم.

## النسيج النسائي

قد تكون مبهمة وغير محددة ولكنها تحاكي أنواعًا أخرى من السرطانات أو الأمراض الشائعة - آلام في البطن/الحوض، نزيف الرحم/الحوض، تورم/انتفاخ البطن و/أو الشعور بسائل في البطن، سخونة وطفح في الجلد، تورم الساق، آلام العظام، ضيق التنفس.




## العظام

ألم في العظام - عادةً في الفخذ والذراع والضلوع والظهر. قد يكون الألم طفيفًا أو ألمًا حادًا. ألم العظام بدون سبب واضح أو إصابة رضحية. أبلغني عن أي ألم جديد أو غير معتاد أو متزايد.



## الجهاز الهضمي

قد تكون مبهمة وغير محددة ولكنها تحاكي أنواعًا أخرى من السرطانات أو الأمراض الشائعة - صعوبة البلع، آلام في البطن، أعراض انسداد الأمعاء، الشعور بالامتلاء مبكرًا عند تناول الطعام، تغيرات في الشهية، الغثيان و/أو الشعور بسائل في البطن، تورم الساق، آلام العظام، ضيق التنفس.



## انضغاط الحبل الشوكي

نادر ولكنه أكثر شيوعًا في سرطان الثدي ويحتاج إلى علاج عاجل

ألم أو إيلايم في منتصف أو أعلى الظهر أو الرقبة، ألم شديد في أسفل الظهر متفاقم أو لا يزول، ألم في الظهر يتفاقم عند السعال أو العطس أو الإجهاد، آلام الظهر تتفاقم في الليل، خدر، ثقل، ألم يحيط بالصدر أو البطن أو ألم أسفل الذراع أو الساق، تغيرات في الإحساس، على سبيل المثال الشعور بدبابيس وإبر أو الإحساس بصدمة كهربائية. **اتصلي بفريقك السريري في أسرع وقت ممكن إذا ظهرت لديك الأعراض التالية** - ضعف أو صعوبة في استخدام الذراعين أو الساقين، وتنميل في المنطقة المحيطة بمجرى الظهر (منطقة السرج)، عدم القدرة على إفراغ الأمعاء أو المثانة، مشاكل في السيطرة على الأمعاء أو المثانة.



يُرجى زيارة: [abcdiagnosis.co.uk](http://abcdiagnosis.co.uk)

تويتر: @abcdiagnosis

فيسبوك: [facebook.com/abcdiagnosis](https://www.facebook.com/abcdiagnosis)



After Breast Cancer Diagnosis

هذا إلى أي موعد وشرحي أن سرطان الثدي الفصيبي أكثر شيوعًا في الانتشار بالعظام أو الجهاز الهضمي أو المبايض pdf احرصي دومًا على إبلاغ طبيبك بأن لديك إصابة سابقة بسرطان الثدي الفصيبي بالإضافة إلى الأعراض، أو أحضري معك ملف.