


# Uitgezaaide / metastatische (lobulaire) borstkanker

Ook bekend als metastatische borstkanker of gevorderde borstkanker

Let na een borstkankerdiagnose op deze **waarschuwingssignalen\*** voor uitgezaaide borstkanker. Er zijn hoofdzakelijk 3 organen waarin uitzaaiingen van borstkanker voor kunnen komen.

**\*DE SYMPTOMEN KUNNEN ANDERE KANKERVORMEN NABOOTSEN, DUS LET OP: ALS SYMPTOMEN LANGER DAN 3 WEKEN AANHOUDEN, NEEM DAN DIRECT CONTACT OP MET UW MEDISCHE TEAM**



## GYNAECOLOGISCH WEEFSEL

Kan vaag en niet specifiek zijn maar andere kankervormen of veelvoorkomende ziektes nabootsen: buik-/bekkenpijn, baarmoeder-/bekkenbloedingen, opgezette/opgeblazen buik en/of het gevoel van vocht in de buik, opvliegers, opgezette benen, botpijn, kortademigheid.

## BOTTEN

Pijn in de botten: meestal in de dijen, armen, ribben en rug. Kan een doffe pijn of stekende pijn zijn. Botpijn zonder duidelijke oorzaak of letsel. Meld nieuwe, ongewone of verhevigde pijn.

## MAAG-DARMSTELSEL

Kan vaag en niet specifiek zijn maar andere kankervormen of veelvoorkomende ziektes nabootsen: moeite met slikken, buikpijn, symptomen van darmverstopping, tijdens het eten snel een vol gevoel, veranderde eetlust, misselijkheid en/of het gevoel van vocht in de buik, opgezette benen, botpijn, kortademigheid.

## VERDRUKKING VAN HET RUGGENMERG

Zeldzaam, maar komt vaker voor bij borstkanker, moet **DRINGEND** behandeld worden

Pijn of gevoeligheid in het midden van of boven aan de rug of nek, hevige pijn in de onderrug die erger wordt of niet weggaat, pijn in de rug die erger is bij het hoesten, niezen of inspanningen, rugpijn die 's nachts verergert, tintelingen, zwaar gevoel, pijn over de hele borst of buik of pijn in een arm of been, veranderde sensaties, bijvoorbeeld tintelingen of elektrische schok-sensaties. **Neem Z.S.M. contact op met uw klinische team als u de volgende symptomen hebt:** slappe armen of benen of problemen met het bewegen van de armen of benen, gevoelloosheid rond de anus (het zadelgebied), de darmen of de blaas niet kunnen legen, controleverlies over de darmen en de blaas.

## ANDERE SYMPTOMEN

**LEVER:** Opgeblazen gevoel, veranderde eetlust, gewichtsverlies, vermoeidheid, slapte, pijn bij de ribben aan de rechterkant.

**LONG:** Scherpe pijn in de borst en rug bij het ademen, droge hoest, vermoeidheid, bloedpropjes kunnen ook kortademigheid veroorzaken.

**HERSENEN:** Vaak hoofdpijn, motorische beperkingen, overgeven ('s ochtends vroeg), duizeligheid, visuele stoornis, beroerte, verminderde intellectuele functies, stemmingswisselingen, evenwichtsproblemen, vermoeidheid. Familieleden en vrienden zeggen misschien dat u niet uzelf bent.

**OOG (zeer zeldzaam):** Veranderd gezichtsvermogen, vooral eenzijdig, zwellingen, pijn.

Vertel uw dokter, naast de symptomen, altijd dat u een medische voorgeschiedenis van lobulaire borstkanker hebt, of neem deze pdf mee naar een afspraak en leg uit dat lobulaire borstkanker vaak naar de botten, het maag-darmstelsel of eierstokken uitzaait.

Ga naar: [abctdiagnosis.co.uk](http://abctdiagnosis.co.uk)

Twitter: @abctdiagnosis

Facebook: [facebook.com/abctdiagnosis](https://www.facebook.com/abctdiagnosis)



After Breast Cancer Diagnosis