



Cancer du sein secondaire / métastatique (lobulaire)

Également connu sous le nom de cancer du sein métastatique ou avancé.

Après un cancer du sein primaire, soyez attentifs à ces **signaux d'alerte*** pouvant indiquer un cancer du sein secondaire. Le cancer du sein secondaire peut apparaître dans trois zones principales.

*** LA VIGILANCE EST DE MISE CAR LES SYMPTÔMES PEUVENT RESSEMBLER À CEUX D'UN AUTRE CANCER. SI LE PROBLÈME PERSISTE PENDANT PLUS DE TROIS SEMAINES, CONTACTEZ DIRECTEMENT VOTRE ÉQUIPE MÉDICALE.**



TISSU GYNÉCOLOGIQUE

Peut être vague et non spécifique mais imiter d'autres cancers ou des maladies courantes : douleurs abdominales/pelviennes, saignements utérins/pelviens, gonflement abdominal et/ou sensation d'un liquide présent dans l'abdomen, bouffées de chaleur, gonflement des jambes, douleurs osseuses, essoufflement.



OSSATURE

Douleur dans les os (généralement dans la cuisse, le bras, les côtes et le dos.) Il peut s'agir d'une douleur sourde ou bien d'une douleur vive. Douleur osseuse sans cause évidente ni traumatisme. Signalez toute douleur nouvelle, inhabituelle ou croissante.



ZONE GASTRO-INTESTINALE

Peut être vague et non spécifique mais imiter d'autres cancers ou des maladies courantes : difficulté à avaler, douleurs abdominales, symptômes d'une occlusion intestinale, sensation de satiété précoce en mangeant, modification de l'appétit, nausées et/ou sensation d'un liquide présent dans l'abdomen, gonflement des jambes, douleurs osseuses, essoufflement.



COMPRESSION DE LA MOELLE ÉPINIÈRE

Rare mais plus fréquente dans le cas du cancer du sein. Nécessite un traitement URGENT.

Douleur ou sensibilité au milieu ou au sommet du dos ou du cou, douleur intense dans le bas du dos qui s'aggrave ou ne disparaît pas, douleur dans le dos qui s'aggrave en cas de toux, d'éternuement ou d'effort intense, douleur dans le dos qui s'aggrave la nuit, engourdissement, sensation de lourdeur, bande de douleur autour de la poitrine ou de l'abdomen ou douleur le long d'un bras ou d'une jambe, changements de sensation, par exemple des picotements ou des sensations de choc électrique. **Contactez votre équipe médicale dès que possible si vous présentez les symptômes suivants** : faiblesse ou difficulté à utiliser les bras ou les jambes, engourdissement de la zone entourant le passage du dos (la zone de la selle), impossibilité de vider les intestins ou la vessie, problèmes de contrôle des intestins ou de la vessie.

Veillez consulter le site : abcdiagnosis.co.uk

Twitter : @abcdiagnosis

Facebook : facebook.com/abcdiagnosis



AUTRES SYMPTÔMES

FOIE : Ballonnements, appétit altéré, perte de poids, fatigue, faiblesse, douleur près des côtes du côté droit.

POUMONS : Une douleur aiguë à la respiration dans la région de la poitrine et du dos, une toux non productive, de la fatigue, ou des caillots sanguins peuvent également provoquer un essoufflement.

CERVEAU : Céphalées fréquentes, altération des capacités motrices, vomissements (dès le matin), vertiges, troubles visuels, crise d'épilepsie, altération des fonctions intellectuelles, sautes d'humeur, trouble de l'équilibre, fatigue. Les membres de votre famille et vos amis pourraient avoir remarqué que vous n'êtes pas dans votre état normal.

ZONE OCULAIRE (très rare) : Changements de la vision (surtout unilatérale), gonflement, douleur.

Assurez-vous de toujours informer votre médecin si vous avez des antécédents de CS lobulaire, en plus de lui faire part de vos symptômes, ou apportez ce PDF lors de tout rendez-vous et expliquez-lui que le CS lobulaire se propage plus souvent aux os, au tube digestif ou aux ovaires.