

Cancro da mama (lobular) metastático/secundário

Também denominado cancro da mama metastático ou avançado

Se sofreu de cancro da mama primário, esteja atenta a estes **sinais de ALERTA*** de cancro da mama secundário. Existem 3 principais zonas onde o cancro da mama secundário pode surgir.

***OS SINTOMAS SÃO SEMELHANTES AOS DE OUTROS CANCROS, POR ISSO, SE ESTES SINAIS DE ALERTA PERSISTIREM DURANTE MAIS DE 3 SEMANAS, CONTACTE DIRETAMENTE O SEU MÉDICO ASSISTENTE**



Visite: abcdiagnosis.co.uk

Twitter: @abcdiagnosis

Facebook: [facebook.com/abcdiagnosis](https://www.facebook.com/abcdiagnosis)




After Breast Cancer Diagnosis



TECIDO GINECOLÓGICO

Podem ser sintomas vagos e não específicos, mas que se assemelham aos de outros cancros ou doenças comuns – dor abdominal/pélvica, sangramento pélvico/uterino, edema/inchaço abdominal e/ou sensação de existência de líquido no abdómen, afrontamentos, inchaço nas pernas, dor óssea, falta de ar.




OSSOS

Dores ósseas — geralmente nas coxas, braços, costelas e costas. Pode sentir uma dor persistente ou dor aguda. Dor óssea sem trauma ou causa evidente. Refira qualquer dor nova, fora do comum ou que se intensifique.



GASTROINTESTINAL

Podem ser sintomas vagos e não específicos, mas que se assemelham aos de outros cancros ou doenças comuns – dificuldade em engolir, dor abdominal, sintomas de obstrução intestinal, sensação de saciação assim que começa a comer, alterações do apetite, náuseas e/ou sensação de existência de líquido no abdómen, afrontamentos, inchaço nas pernas, dor óssea, falta de ar.



COMPRESSÃO DA MEDULA ESPINAL

Sintomas raros, mas mais comuns em casos de cancro da mama. Requer tratamento URGENTE

Dor ou sensibilidade na parte central ou superior das costas ou pescoço, dor forte na parte inferior das costas que se agrava ou não desaparece, dor nas costas que se agrava quando tosse, espirra ou faz esforços, dor nas costas mais forte durante a noite, dormência, sensação de peso, dor no peito e abdómen ou dor que irradia pelos braços ou pernas, alterações das sensações, como por exemplo formigueiro ou sensação de choque elétrico. **Contacte o seu médico de imediato, caso tenha algum dos seguintes sintomas:** sensação de fraqueza ou dificuldade em usar os braços ou as pernas, dormência na zona retal, dificuldade em evacuar ou urinar, problemas no controlo da bexiga ou dos intestinos.

OUTROS SINTOMAS

FÍGADO: Sensação de barriga inchada, alterações do apetite, perda de peso, fadiga, fraqueza, dor na zona das costelas do lado direito.

PULMÕES: A dor aguda no peito e costas ao inspirar, a tosse seca, fadiga e os coágulos de sangue também podem causar falta de ar.

CÉREBRO: Dores de cabeça frequentes, vômitos (de manhã cedo), tonturas, perturbações visuais, convulsões, função intelectual comprometida, alterações de humor, desequilíbrio, fadiga. Os seus amigos e familiares podem dizer-lhe que não está no seu estado normal.

OLHOS (extremamente raro): Alterações da visão – sobretudo da visão unilateral, edema, dor.

Certifique-se de que informa o seu médico assistente sobre o seu histórico familiar de cancro da mama lobular e sobre os seus sintomas ou faça-se acompanhar deste PDF nas consultas e explique que este tipo de cancro da mama pode alastrar mais frequentemente para os ossos, trato gastrointestinal ou ovários.