


# Cáncer de mama secundario/metastático (lobular)

También conocido como cáncer de mama metastásico o avanzado

Después de un cáncer de mama primario, tenga en cuenta las siguientes **señales de ALARMA\*** del cáncer de mama secundario. Este tipo de cáncer puede aparecer en tres grandes zonas.

**\* TENGA EN CUENTA QUE LOS SÍNTOMAS PUEDEN ASEMEJARSE A LOS DE OTROS TIPOS DE CÁNCER. SI ESTOS PROBLEMAS PERSISTEN MÁS DE 3 SEMANAS, PÓNGASE EN CONTACTO CON SU EQUIPO MÉDICO DIRECTAMENTE.**



## TEJIDO GINECOLÓGICO

Puede ser vago y poco específico, pero se asemeja a otros tipos de cáncer o enfermedades comunes: dolor abdominal/pélvico, sangrado uterino/pélvico, inflamación/hinchazón abdominal y/o sensación de fluidos en el abdomen, sofocos, piernas hinchadas, dolor de huesos, dificultad para respirar.

## HUESOS

Dolor en los huesos, especialmente en muslos, brazos, costillas y espalda. Puede tratarse de un dolor sordo o de dolor intenso y punzante. Dolor de huesos sin causa aparente ni traumatismos. Consulta cualquier dolor nuevo, inusual o creciente.

## GASTROINTESTINAL

Puede ser vago y poco específico, pero se asemeja a otros tipos de cáncer o enfermedades comunes: dificultad al tragar, dolor abdominal, síntomas de obstrucción intestinal, sensación de lleno tras comer poco, cambios en el apetito, náuseas y/o sensación de fluidos en el abdomen, piernas hinchadas, dolor de huesos, dificultad para respirar.

## COMPRESIÓN DE LA MÉDULA ESPINAL

Poco frecuente pero más común en cánceres de mama, requiere tratamiento URGENTE

Dolor o sensibilidad en la parte media o superior de la espalda o el cuello, dolor severo en la parte baja de la espalda que empeora o no desaparece, dolor en la espalda que se agrava al toser, estornudar o hacer esfuerzos, dolor de espalda que empeora por la noche, entumecimiento, pesadez, dolor en el pecho o el abdomen o dolor en el brazo o en la pierna, cambios de sensación, por ejemplo hormigueo o calambres. **Póngase en contacto con su equipo médico DE INMEDIATO si tiene alguno de los siguientes síntomas:** debilidad o dificultad para mover los brazos o las piernas, entumecimiento en la zona pélvica, incapacidad para vaciar los intestinos o la vejiga, problemas de incontinencia.

## OTROS SÍNTOMAS

**HÍGADO:** Hinchazón, falta de apetito, pérdida de peso, fatiga, debilidad, dolor en la zona de las costillas (en el lado derecho).

**PULMONES:** El dolor agudo al respirar en la zona del pecho y la espalda, la tos improductiva, la fatiga y los coágulos también pueden provocar dificultades respiratorias.

**CEREBRO:** Dolores de cabeza frecuentes, alteraciones de las habilidades motoras, vómitos (a primera hora de la mañana), mareos, problemas de visión, convulsiones, alteraciones de las funciones intelectuales, cambios de humor, pérdida de equilibrio, fatiga. Su familia y amigos pueden decir que no es usted misma/o.

**OJOS (muy poco frecuentes):** Alteraciones de la visión (especialmente unilaterales), hinchazón, dolor.

Asegúrese de indicar a su médico que tiene antecedentes de cáncer de mama lobular además de síntomas o lleve este PDF consigo a cada cita y explique que el cáncer de mama lobular suele extenderse a los huesos, el tracto intestinal o los ovarios.

Visite: [abcdiagnosis.co.uk](http://abcdiagnosis.co.uk)

Twitter: @abcdiagnosis

Facebook: [facebook.com/abcdiagnosis](https://www.facebook.com/abcdiagnosis)