



# Sekundär/metastatisk (lobulär) bröstcancer

Kallas även metastaserad eller avancerad bröstcancer


Efter primär bröstcancer, var medveten om dessa **RÖDA flaggor\*** för sekundär bröstcancer. Sekundär bröstcancer kan i huvudsak uppstå på följande tre områden:

**\*SYMPTOMEN KAN EFTERLIKNA ANDRA CANCERFORMER SÅ VAR UPPMÄRKSAM PÅ DETTA. OM DET RÖDFLAGGADE PROBLEMET KVARSTÅR EFTER TRE VECKOR SKA DU KONTAKTA DIN LÄKARE DIREKT**




## GYNEKOLOGISK VÄVNAD

Kan vara vag och ospecifik men efterlikna andra cancerformer eller vanliga sjukdomar: smärta i buken/bäckenet, livmoder-/bäckenblödning, buksvullnad/uppblåsthet och/eller en känsla av vätska i buken, värmevallningar, svullna ben, skelettsmärter, andnöd.




## SKELETT

Skelettsmärta – ofta lår, arm, revben och rygg. Kan vara en molande värk eller en skarp, skjutande smärta. Skelettsmärta utan någon uppenbar förklaring eller trauma. Rapportera ny, ovanlig eller tilltagande smärta.



## MAG- OCH TARMKANALEN

Kan vara vag och ospecifik men efterlikna andra cancerformer eller vanliga sjukdomar: svårigheter att svälja, buksmärter, symtom på tarmobstruktion, tidig mättnadskänsla vid måltid, aptitförändringar, illamående och/eller en känsla av vätska i buken, svullna ben, skelettsmärter, andnöd.



## RYGGMÄRGSKOMPRESSION

Ovanlig, men vanligare vid bröstcancer och kräver **OMEDELBAR** behandling

Smärta eller ömhet i mitten eller övre delen av ryggen eller nacken, svår smärta i ländryggen som förvärras eller inte försvinner, smärta i ryggen som blir värre vid hostning, nysning eller ansträngning, ryggsmärta som blir värre på natten, domningar, tunghetskänsla, ett band av smärta runt bröstet eller buken eller smärta utmed en arm eller ett ben, förändringar i känsel, till exempel stickningar eller en känsla av elektriska stötar i kroppen. **Kontakta ditt vårdteam OMEDELBART om du upplever något av följande symtom:** svaghet eller svårighet att använda armar eller ben, domningar i området kring anus (ridbyxområdet), svårighet att tömma tarmen eller urinblåsan, problem att kontrollera tarmen eller urinblåsan.

Läs mer på: [abcdiagnosis.co.uk](http://abcdiagnosis.co.uk)

Twitter: @abcdiagnosis

Facebook: [facebook.com/abcdiagnosis](https://www.facebook.com/abcdiagnosis)



After Breast Cancer Diagnosis

## ANDRA SYMTOM

**LEVER:** Uppsvällighet, aptitpåverkan, viktminskning, trötthet, svaghet, smärta nära revbenen på höger sida.

**LUNGA:** Skarp smärta i bröst- och ryggregionen vid inandning, torrhosta, trötthet, blodproppar kan också orsaka andnöd.

**HJÄRNA:** Frekvent huvudvärk, nedsatt motorik, kräkningar (direkt på morgonen), yrsel, synstörningar, kramper, nedsatt intellektuell förmåga, humörsvängningar, balanspåverkan, trötthet. Familjemedlemmar och vänner kan påpeka att du inte är dig riktigt lik.

**ÖGA (mycket ovanligt):** Synförändringar – i synnerhet ensidig, svullnad, smärta.

Berätta alltid för din läkare att du utöver dina symtom har lobulär bröstcancer i din sjukdomshistoria, eller ta med denna pdf till läkarbesöket och förklara att lobulär bröstcancer kan sprida sig till ben, mag-tarmkanalen eller äggstockarna.